

# SORVEGLIANZA SANITARIA PER I SOCCORRITORI ESPOSTI A POTENZIALE CONTATTO CON SARS-CoV-2



LIVELLO DI RISCHIO	CONTATTI	MISURE DA ADOTTARE
<b>BASSO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Qualunque soccorritore che, nello svolgimento di un intervento di primo soccorso rispetto a un caso di COVID-19, abbia seguito nel dettaglio e senza discrepanze il <b>Protocollo operativo per soccorritori delle ambulanze di primo soccorso</b> (in allegato)</li> <li>▶ Qualunque soccorritore che, sprovvisto di DPI, sia entrato in contatto diretto (distanza inferiore ai 2 metri e per un tempo maggiore di 15 minuti) con un caso di COVID-19 in un paziente munito di mascherina chirurgica</li> </ul>	<p>Il soccorritore viene considerato <b>a rischio di infezione nullo</b> e può pertanto permanere in servizio, con la precauzione tuttavia di misurarsi la temperatura corporea due volte al giorno per i successivi 14 giorni. In caso di comparsa di febbre e/o di sintomi simil-influenzali, il soccorritore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ restare in casa;</li> <li>▶ indossare una mascherina chirurgica se non in casa e dirigersi verso di essa;</li> <li>▶ segnalare immediatamente l'accaduto al proprio Capo Servizi o al proprio Governatore.</li> </ul> <p>Sarà tempestiva premura del Capo Servizi o del Governatore inviare opportuna scheda di segnalazione per la sorveglianza sanitaria ai seguenti destinatari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Direttore della Centrale Operativa 118 territorialmente competente</li> <li>2) Medico competente di riferimento</li> <li>3) Direzione Sanitaria di riferimento</li> </ol> <p>Saranno di conseguenza fornite opportune indicazioni comportamentali in caso di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria.</p>
<b>MEDIO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Qualunque soccorritore che, nello svolgimento di un intervento di primo soccorso rispetto a un caso di COVID-19, <b>NON</b> abbia seguito nel dettaglio o lo abbia fatto con discrepanze il <b>Protocollo operativo per soccorritori delle ambulanze di primo soccorso</b> (in allegato) <b>SENZA</b> tuttavia un'esposizione diretta ai materiali biologici del paziente (es. saliva o secrezioni respiratorie)</li> <li>▶ Qualunque soccorritore che, sprovvisto di DPI, si sia trovato in un ambiente chiuso o sia entrato in contatto diretto (distanza inferiore ai 2 metri e per un tempo maggiore di 15 minuti) con un caso di COVID-19 in un paziente sprovvisto di mascherina chirurgica</li> </ul>	<p>Il soccorritore viene considerato <b>a rischio di infezione sospetto</b> e deve sospendere il servizio. Deve inoltre:</p> <p>In caso di comparsa di febbre e/o di sintomi simil-influenzali, il soccorritore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ restare in casa;</li> <li>▶ indossare una mascherina chirurgica se non in casa e dirigersi verso di essa;</li> <li>▶ segnalare immediatamente l'accaduto al proprio Capo Servizi o al proprio Governatore.</li> </ul> <p>Sarà tempestiva premura del Capo Servizi o del Governatore inviare opportuna scheda di segnalazione per la sorveglianza sanitaria ai seguenti destinatari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Direttore della Centrale Operativa 118 territorialmente competente</li> <li>2) Medico competente di riferimento</li> <li>3) Direzione Sanitaria di riferimento</li> </ol> <p>Saranno di conseguenza fornite opportune indicazioni comportamentali in caso di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria.</p>
<b>ALTO</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Qualunque soccorritore che, nello svolgimento di un intervento di primo soccorso rispetto a un caso di COVID-19, <b>NON</b> abbia seguito nel dettaglio o lo abbia fatto con discrepanze il <b>Protocollo operativo per soccorritori delle ambulanze di primo soccorso</b> (in allegato) <b>CON</b> un'esposizione diretta ai materiali biologici del paziente (es. saliva o secrezioni respiratorie)</li> </ul>	<p>Il soccorritore viene considerato <b>a rischio di infezione sospetto</b> e deve sospendere il servizio. Deve inoltre:</p> <p>In caso di comparsa di febbre e/o di sintomi simil-influenzali, il soccorritore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ restare in casa;</li> <li>▶ indossare una mascherina chirurgica se non in casa e dirigersi verso di essa;</li> <li>▶ segnalare immediatamente l'accaduto al proprio Capo Servizi o al proprio Governatore.</li> </ul> <p>Sarà tempestiva premura del Capo Servizi o del Governatore inviare la <b>Scheda di segnalazione sorveglianza sanitaria degli operatori esposti a contatto con infezioni da nuovo Coronavirus per motivi di servizio</b> (in allegato) ai seguenti destinatari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Direttore della Centrale Operativa 118 territorialmente competente</li> <li>2) Medico competente di riferimento</li> <li>3) Direzione Sanitaria di riferimento</li> </ol> <p>Saranno di conseguenza fornite opportune indicazioni comportamentali in caso di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria.</p>

